

CONHECER PARA RECONHECER

FUNCTORES DE VALOR DE VERDADE

VERBETE

Terça-Feira, 10 de Novembro de 2020 17:52:20

VERBETE - TRADUÇÃO

FONTE: Joerden, Jan C. 2 Aufl. Logik im Recht. Grundlagen und Anwendungsbeispiele. Heidelberg: Springer, 2010, S. 14 f.

TRADUTOR: Luís Afonso Heck

Semestre de inverno de 2018

Para uso em sala de aula – UFRGS – Faculdade de Direito

Anexos: 01

FUNCTORES DE VALOR DE VERDADE

Alguns funtores de valor de verdade diádicos (denominados funtores de valor de verdade diádicos, porque eles dizem respeito *em duas variáveis* (*diadicamente*) a declarações ao, cada vez, ser considerado o enlace lógico de *duas* declarações (aqui x e y) [da tabela de verdade de Wittgenstein]).

$\vee$	Disjunção	pelo menos, um (não nenhum)
$\rightarrow$	Implicação	o um não sem o outro
$\leftrightarrow$	Equivalência	não um sozinho (ambos ou nenhum)
$\wedge$	Conjunção	ambos
$/$	Exclusão	no máximo, um (não ambos)
$\vee\!\!\!\diagup\!\!\!$	Não-equivalência	rigorosamente um de ambos (ou um ou outro)

- $\vee$ Disjunção: pelo menos, um (não nenhum)
- $\rightarrow$ Implicação: o um não sem o outro
- $\leftrightarrow$ Equivalência: não um sozinho (ambos ou nenhum)
- $\wedge$ Conjunção: ambos
- $/$ Exclusão: no máximo, um (não ambos)
- $\vee\!\!\!\diagup\!\!\!$ Não-equivalência: rigorosamente um de ambos (ou um ou outro)

Fonte: Joerden, Jan C. 2 Aufl. Logik im Recht. Grundlagen und Anwendungsbeispiele. Heidelberg: Springer, 2010, S. 14 f. (Pontuação no original.)

MARCADORES

Verbetes |